

Signes et symptômes

- saignement anormal (en dehors des règles, après les rapports sexuels, après un examen gynécologique, ou après la ménopause)
- règles plus longues ou plus abondantes
- sécrétions vaginales inhabituelles
- petits condylomes
- brûlures ou démangeaisons qui apparaissent dans la zone génitale

Dépistage du cancer du col

Il existe plusieurs types de dépistage pour le cancer du col, dont :

- inspection à l'œil nu après application de l'acide acétique (IVA)
- frottis cervical de Papanicolaou




Bonnes nouvelles !

Le cancer du col est évitable
et peut être prévenu si le
diagnostic est précoce



Qu'est ce que le cancer du col de l'utérus ?

Le col de l'utérus est la partie la plus basse de l'utérus en rapport avec le vagin. Le cancer du col de l'utérus se développe quand des cellules normales se transforment en cellules cancéreuses. La transformation en cellules cancéreuses est le fait d'une infection virale facteur déterminant dans la survenue du cancer : l'infection au virus du papillome humain (VPH).



Facteurs de risques

Toutes les femmes sont exposées au même risque de survenue du cancer du col mais certains facteurs sont associés à sa survenue, notamment :

- activité sexuelle avant l'âge de 20 ans
- partenaires sexuels multiples
- exposition à une infection sexuellement transmissible (IST)
- mère ou sœur atteinte du cancer du col
- frottis vaginal de Papanicolaou précédent anormal
- excès de tabagisme
- baisse des défenses de l'organisme (immunodépression à cause du VIH/SIDA ou de l'utilisation chronique de corticostéroïdes)

Qu'est-ce que l'IVA ?

C'est un examen rapide que le prestataire réalise pendant l'examen pelvien. L'IVA est une technique simple qui utilise du vinaigre pour faire ressortir les lésions précancéreuses sous formes de taches blanchâtres au niveau du col. La pratique de l'IVA n'est pas douloureuse et elle n'a pas d'effets secondaires. L'agent de santé pourra vous donner les résultats de l'IVA juste après l'examen.


Qu'est-ce que le frottis cervical de Papanicolaou ?

Comme l'IVA, le frottis de Papanicolaou est fait pendant l'examen pelvien. Le prestataire fait un prélèvement des cellules du col et l'envoie au laboratoire pour l'analyse. On peut s'attendre à recevoir les résultats à peu près un mois plus tard.

Le dépistage du cancer du col est disponible dans les centres équipés à cet effet.



Sain col



Lésion précancéreuse



Cancer

Traitement

En cas d'IVA positive (lésions précancéreuses), le traitement avec la cryothérapie peut être offert immédiatement.

- La cryothérapie est une méthode impliquant la double congélation du col à l'aide d'un agent de refroidissement. Elle a pour but de détruire les lésions découvertes pendant l'IVA.
- La cryothérapie n'est pas douloureuse et se réalise en quelques minutes.

Si l'IVA révèle que les lésions sont trop grandes, l'agent de santé vous enverra dans un site de référence pour une prise en charge.

Prévention

Les moyens de prévention sont multiples :

- les préservatifs
- la fidélité
- la vaccination contre le VPH
- le dépistage précoce pouvant conduire à un traitement
- un mode de vie sain (la bonne alimentation, un sommeil adéquat, un exercice régulier, et une bonne gestion du stress)